**Bei trockenem Reizhusten.
Für die ganze Familie.**

- **Selektiver antitussiver Effekt: wirkt gezielt auf das Hustenzentrum¹.**
- **Gehört nicht zur Klasse der Narkotika¹.**
- **Keine depressive Wirkung auf das zentrale Nervensystem¹.**
- **Verursacht keine Obstipation¹.**

Dosierung:

Alter	Tagesdosis
Säuglinge-6 Monate	2-3-mal täglich 5 ml
6 Monate-3 Jahre	3-6-mal täglich 5 ml
3-10 Jahre	2-3-mal täglich 15 ml
> 10 Jahre und Erwachsene	3-4-mal täglich 15 ml

Ab 2 Jahren ohne ärztliche Verordnung.

**Fertigsirup
für die ganze Familie**
50 mg/5 ml 180 ml

Nach dem ersten Öffnen innerhalb von 3 Monaten aufbrauchen.

Das was Sie über Nitux wissen sollten

Zusammensetzung

Wirkstoff: Morclofonum

Hilfsstoffe: Konservierungsmittel: Methyl-p-hydroxybenzoat (E 218), Propyl-p-parahydroxybenzoat (E 216); Zitrone Aroma; Saccharose und andere Hilfsstoffe.

Hinweis für Diabetiker: Der Sirup enthält Saccharose. 15 ml enthalten dabei 7,5 g verwertbare Kohlenhydrate.

Kontraindikationen

Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff Morclofon oder einem der Hilfsstoffe gemäss Zusammensetzung (z.B. bei Paragruppenallergie auf die Hilfsstoffe E 216 und E 218) sowie bei Fruktose-Intoleranz (aufgrund des Gehaltes an Saccharose).

Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen

Bei Säuglingen und Kleinkindern unter 2 Jahren nur unter ärztlicher Kontrolle anwenden.

Bei Patienten mit einem produktiven Husten kann die gleichzeitige Verabreichung mukolytischer oder sekretolytischer Substanzen zu einem unerwünschten Sekretstau in den Bronchien führen. Dies erhöht das Risiko einer Atemwegsinfektion und eines Bronchospasmus.

Interaktionen

Die gleichzeitige Verabreichung eines Expectorans oder Mukolytikums sollte vermieden werden.

Wegen des zentralen Wirkungsmechanismus der Hustendämpfung kann eine Wirkungsverstärkung gleichzeitig verabreichter zentral dämpfender Substanzen einschliesslich Alkohol nicht ausgeschlossen werden. Die gleichzeitige Gabe solcher Substanzen ist zu vermeiden.

Schwangerschaft/Stillzeit

Nitux soll während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht verabreicht werden, es sei denn dies ist eindeutig notwendig.

Wirkung auf die Fahrtüchtigkeit und auf das Bedienen von Maschinen

Ein Einfluss des Arzneimittels auf die Fahrtüchtigkeit und auf das Bedienen von Maschinen kann wegen des zentralen Wirkungsmechanismus nicht ausgeschlossen werden.

Unerwünschte Wirkungen

Im Rahmen von klinischen Studien sind häufig leichte gastrische Störungen (Pyrosis, Übelkeit, Erbrechen) sowie gelegentlich Kopfschmerzen, Somnolenz und Sedation beobachtet worden. Aus langjähriger Post-Marketing-Erfahrung sind folgende Fälle gemeldet worden:

Immunsystem: Typ I allergische Reaktionen (Urtikaria, allergisches Angioödem).

Nervensystem: Somnolenz.

Gastrointestinaltrakt: abdominale Schmerzen, Nausea.

Haut: Pruritus, urtikarielles Erythem.

Ausführliche Angaben finden Sie auf <http://www.swissmedicinfo.ch>.

1. NITUX, www.swissmedicinfo.ch (konsultiert im August 2019)

NITUX® Z: Morclofon. **I:** Trockener Reizhusten verschiedenen Ursprungs. **D:** Kinder unter 2 Jahren nur nach ärztlicher Verordnung. Säuglinge bis 6 Monate 2–3mal tgl. 5 ml; 6 Monate bis 3 Jahre 3–6mal tgl. 5 ml; 3 bis 10 Jahre 2–3mal tgl. 15 ml; ab 10 Jahren und Erwachsene 3–4mal tgl. 15 ml. **KI:** Überempfindlichkeit, Paragruppenallergie (E216, E218), Fruktoseintoleranz. **VM:** Kinder bis 2 Jahren nur unter ärztlicher Kontrolle anwenden. Anwendung bei produktivem Husten und gleichzeitige Verabreichung mukolytischer oder sekretolytischer Substanzen kann zu einem Sekretstau, mit erhöhtem Risiko einer Atemwegsinfektion und eines Bronchospasmus, führen. **UW:** Leichte gastrische Störungen, Kopfschmerzen, Somnolenz, allergische Reaktionen. **IA:** Gleichzeitige Gabe von eines Expectorans, Mukolytikums oder zentral dämpfenden Substanzen, einschliesslich Alkohol, vermeiden. **SS/S:** Vorsicht geboten. **H:** Sirup enthält Saccharose, 15 ml Sirup: 7.5 g verwertbare Kohlenhydrate; Nach Anbruch innerhalb von 3 Monaten aufbrauchen **P:** Flasche zu 180 ml Sirup (D). [April 2019]. Ausführliche Angaben finden Sie auf <http://www.swissmedicinfo.ch>.

Informationen für Fachpersonen bestimmt.

Zambon Schweiz AG, Via Industria 13 – CH-6814 Cadempino, www.zambonpharma.com/ch